



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA CEDEX
Tél. 61. 24. 06. 51

Régisseur de Recettes
D.R.A.F. "MIDI-PYRÉNÉES"
CCP : 8618-62 Y Toulouse
I.S.S.N. : 0752-2053

PUBLICATION PERIODIQUE
BULLETIN N° 1 DU 18 JANVIER 1989

150 F.
ABONNEMENT ANNUEL : XXXX

Note commune CETIOM-SRPV (*)

PROTECTION DES SEMIS DE TOURNESOL

★ CONTRE LES MALADIES

Fontes des semis

Il est indispensable d'utiliser des semences traitées avec les fongicides autorisés pour cet usage.

Mildiou

Les semences traitées au métalaxyl (APRON 35) sont protégées contre le Mildiou, y compris les nouvelles races observées en France en 1988.

★ CONTRE LES INSECTES DU SOL

Le choix d'un produit en traitement du sol doit être guidé par son efficacité sur taupins essentiellement. Les risques les plus grands sont encourus dans le cas de précédents prairies ou de semis précoces. Utiliser l'un des produits du tableau ci-dessous.

Matière active	dose en g/ha	Spécialité commerciale	dose en kg ou l/ha	Observations
Traitement en plein				
lindane	1500	nombreuses spécialités	1,7	A réserver à de fortes infestations. Traiter 15 jours à 3 semaines avant semis. Action complémentaire sur noctuelles.
chlorpyriphos + lindane	1500 + 800	LORSBAN L 16, LORSBAN liquide 5 KREGAN, KREGAN liquide	5	
Traitement en localisation				
bendiocarbe	300	GARVOX 3G, NIOMIL 3G	10	Très actif sur taupins.
benfuracarbe	600	ONCOL 5G	12	Très actif sur taupins.
carbofuran	600	CURATER, DELEX, RAMPAR	12	Très actif sur taupins. Active souvent la végétation.
carbosulfan	750	MARSHALL FORT	7,5	Bon sur taupins.
chlorméphos	300	DOTAN	6	Bon sur taupins. Economique.
furathiocarbe	600	DELTANET	12	Très actif sur taupins. Active souvent la végétation. Longue rémanence.
terbuphos	200	COUNTER PLUS	8	Moyen à bon sur taupins. Active souvent la végétation.
chlorthiophos	237,6	CELATHION L	8	Moyen à bon sur taupins.
+ lindane	+ 136			
aldicarbe	500	TEMIK M	15	Moyen à bon sur taupins.
+ lindane	+ 200			
fonophos	200	FOLANE	6	Moyen à bon sur taupins.
+ lindane	+ 100			

(*) CETIOM : Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains - Région S.O.
SRPV : Service Régional de la Protection des Végétaux.

60 43419

1989. 01-17

P. 26

LUTTE CONTRE LE REVERDISSEMENT DES LABOURS AVANT TOURNESOL ET SOJA

Cette pratique est recommandée en terreforts, argiles, argilo-calcaires, terres franches ou bons limons labourés avant l'hiver.

★ TERRES PROPRES OU ENHERBEES

Traitement possible jusqu'au 15/02/1989

Utiliser : LEGURAME à 4 kg/ha

ou KERB 50 à 1,5 kg/ha ou KERB FLO à 1,8 l/ha

En présence de dicotylédones, ajouter un produit commercial à base de linuron (sur la base de 500 g de matière active/ha)

★ TERRES ENHERBEES

Utiliser WEEDAZOL à 15 l/ha (efficace sur dicotylédones et graminées) en laissant un délai de 1 mois entre l'application et le semis du tournesol.

Traitement possible jusqu'au 15/03/1989

Utiliser : STING à 3 l/ha en présence de dicotylédones et graminées
à 4 l/ha si dicotylédones très développées

ou ROUNDUP à 1 l/ha + GENAMIN à 1 l/ha en présence de graminées annuelles

ROUNDUP à 2 l/ha + GENAMIN à 1 l/ha en présence de dicotylédones développées

ROUNDUP à 3 l/ha + GENAMIN à 1 l/ha en présence de vivaces précoces

Traitement possible jusqu'au moment du semis

Utiliser : GIROR à 6 l/ha en présence de dicotylédones et graminées peu développées
à 8 l/ha en présence de dicotylédones bien développées

ou GRAMOXONE PLUS à 3 l/ha en présence de mauvaises herbes jeunes

à 4 l/ha en présence de mauvaises herbes bien développées

(ajouter AGRAL 90 à 0,1 l/hl au GRAMOXONE)

DESHERBAGE DE LA CULTURE DE TOURNESOL

Type de sol	Epoques d'application		
	Pré-semis incorporé	Post-semis/Pré-levée	Post-levée
Terreforts argileux ou argilo-calcaires ou terres franches	trifluraline 1200 g ma/ha	RACER ME à 2 l <u>ou</u> RONSTAR à 3 l <u>ou</u> CHALLENGE à 3,5 l	En présence de graminées, utiliser un des produits ci-dessous pour les programmes RACER ou CHALLENGE ou RONSTAR :
		<u>ou</u> PROWL à 3 l	
	DUELOR à 2,2 l	RACER ME à 2 l <u>ou</u> RONSTAR à 3 l <u>ou</u> CHALLENGE à 3,5 l	FERVIN à 1 kg + huile à 3 l <u>ou</u> FERVINAL à 1,5 l + huile à 3 l
		<u>ou</u> RACER ME à 3 l <u>ou</u> CHALLENGE à 4,5 l <u>ou</u> RONSTAR à 3 l	
Boulbènes ou limons battants	RACER ME à 2,5 l <u>ou</u> CHALLENGE à 4,5 l <u>ou</u> RONSTAR à 2 l <u>ou</u> DUELOR à 2,2 l + RACER ME à 2 l <u>ou</u> DUELOR à 2,2 l + RONSTAR à 2 l		TARGA à 1,25 l <u>ou</u> GALLANT à 1,25 l

Remarques

Trifluraline : à utiliser en cas de flore de graminées de moyenne importance

RACER ME : préférer RACER si la flore de crucifères est dominante

RONSTAR : préférer RONSTAR si la flore de renouées est dominante

CHALLENGE 600 : assez complet sur dicotylédones sauf sur morelle, renouée des oiseaux et amarantacées. Très sélectif

DUELOR : utilisé aussi en post semis, pré-levée, l'incorporation n'étant pas indispensable